

ДЭВИД СИБЛИ

БЕСТСЕЛЛЕР
AMAZON,
более 5000
положительных
отзывов

КАКОВО

БЫТЬ

ПТИЦЕЙ

о полетах
и гнездовании,
кормлении
и пении

как и чем живут самые
известные птицы на земле



БОМБОРА

Предисловие

Работа над этой книгой шла на протяжении 15 лет. В начале 2000-х я задумал создать справочник по птицам для детей. Затем я решил, что этот справочник должен быть ориентирован на любой возраст. Однако после написания подробного справочника по птицам Северной Америки меня уже не устраивал этот формат. Теперь мне захотелось сделать более общее пособие о птицах для начинающих.

Движимый желанием сделать эту книгу интереснее и разнообразнее, я решил добавить интересных фактов, чтобы читатель мог узнать больше о птицах, которых пытается распознать. Чем больше я писал этих заметок, тем больше узнавал сам и тем увлекательнее становилось содержание. В итоге книга превратилась в некий сборник заметок.

Надеюсь, что эта моя работа поможет читателям осознать, каково это — быть птицей. Каждая статья описывает какой-либо аспект жизни птиц. Читать их нужно по отдельности, причем не обязательно по порядку — здесь все взаимосвязано, и перекрестные ссылки подсказывают, к какой статье можно обратиться дальше.

Что больше всего впечатлило меня во время работы над книгой? Пожалуй, неожиданно богатый и довольно сложный мир переживаний птиц. И коль это стало новостью для меня, посвятившего жизнь изучению птиц, наверняка это удивит и моих читателей.

Оказывается, птицы постоянно принимают решения. К примеру, строительство гнезда — это инстинктивный процесс. Годовалая птица без всякого обучения способна выбрать материал и построить довольно сложное гнездо, ничем не отличающееся от других гнезд птиц того же вида. Однако эта же самая птица при изменении окружающих условий может изменить свой подход к строительству гнезда: выбрать другой материал, построить гнездо быстрее, утеплить его и т.д. А само решение, где и когда строить гнездо, является результатом сложного аналитического процесса.

Гаичка, прилетающая к вам на кормушку и хватающая семечко, также делает выбор относительно того, какое семечко взять, спрятать его или съесть сразу. Сойки прячут еду, но если им покажется, что другая сойка видела их тайник, то через несколько минут они вернутся и перепрячут добычу. Внеш-

ний вид самца каролинской утки стал именно таким просто потому, что когда-то самки сочли его привлекательным. Одним словом, жизнь птиц сложна и многообразна.

Мы считаем инстинкт набором указаний, управляющих поведением птиц. Они «вшиты» в их ДНК и передаются из поколения в поколение. Кому-то даже может показаться, что птицы — это некие зомбиподобные роботы. Согласно такому представлению, с наступлением весны у птиц запускается программа постройки гнезд и обзаведения потомством. Отчасти так и есть, но это слишком уж примитивно. Когда птицы чувствуют потребность обзавестись потомством, они выбирают партнеров на основании множества факторов, тщательно подыскивают место для гнезда и т.д.

Инстинкты птиц не мешают им делать выбор. По мере работы над этой книгой я все больше убеждался в том, что инстинкт управляет птицей с помощью чувств — удовлетворения, тревоги, ощущения своего статуса и многого другого. Может быть, я слишком уж очеловечиваю птиц, однако как иначе объяснить сложные решения, которые они принимают каждый день, искусно балансируя между необходимостью питаться и размножаться и стремлением минимизировать риски?

Возможно, чувство, которое появляется у иволги при виде своего законченного гнезда, сродни чувству, которое испытывают будущие родители, глядя на свежеремонтрованную детскую. И гаичка, вероятно, может «спать спокойно», если провела день, запасая пищу на предстоящую зиму. Я полагаю, что самец и самка канадской казарки чувствуют потребность друг в друге, что оба родителя древесной ласточки чувствуют удовлетворение, когда могут принести птенцам достаточно еды, и что желтые древесницы могут испытывать «гордость» за свою территорию и свое семейство. Поймите правильно: я не утверждаю, что желтые древесницы беседуют друг с другом о том, что чем-то гордятся. Я лишь хочу сказать, что эти чувства у нас могут быть отзвуками инстинктов наших животных предков.

В этой книге рассказывается о том, каково быть птицей, а это проще всего объяснить, проводя аналогии с человеком. Работая над книгой, я не раз удивлялся тому, как много общего у нас с птицами, однако и колоссальной разнице между нами я тоже иногда поражался. Надеюсь, что вы, мои читатели, увлечетесь птицами и займетесь активным наблюдением за миром природы.

Дирфилд, Массачусетс

Как пользоваться ЭТОЙ КНИГОЙ

Охват

Эта книга — введение в орнитологию. Это лишь краткий и неполный справочник, касающийся мира птиц очень поверхностно. Книга предназначена не для того, чтобы читать ее от начала до конца по порядку, а для того, чтобы заглядывать в нее время от времени.

Включенные в эту книгу виды птиц широко распространены в США и Канаде. Однако общие сведения и биологические характеристики вполне применимы к птицам во всем мире.

Структура

Главная часть книги — справочник. В этом разделе на левой странице каждого разворота представлены 87 больших изображений птиц примерно в натуральную величину. Правая страница отведена под короткие статьи на сопутствующие темы, в которых упоминаются и другие виды птиц. Каждая статья проиллюстрирована рисунками меньшего размера, эскизами или схемами, на которых изображены упомянутые виды птиц или родственные им.

Последовательность видов соответствует общепринятой таксономической последовательности: сначала упоминаются гусеобразные, а последними идут дроздовые, но встречаются и исключения: например, водоплавающие птицы описаны раньше наземных птиц.

Темы распределены случайным образом, и такая широкая тема, как зрение птиц, обсуждается в нескольких статьях. Перекрестные ссылки помогут вам перейти от одной статьи к тематически связанной с ней статье на другой странице.

Введение предназначено для того, чтобы облегчить поиск связанных друг с другом статей. Статьи в нем сгруппированы по логическому принципу, причем для каждой из них указана страница. При желании можно быстро найти все статьи в книге, посвященные той или иной теме.

Раздел «Птицы в этой книге» состоит из описаний каждого вида птиц, изображенных на иллюстрациях. В этих описаниях дана информация о конкретном виде птиц и их особенностях, о родственных видах. Во многих случаях эта информация служит началом разговора на другую тему, косвенно связанную с изображением.

Многие из статей основаны на научных исследованиях, источники которых приведены в конце книги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку в книгу вошли лишь избранные статьи, она не является исчерпывающим трудом по орнитологии и освещает лишь темы, показавшиеся мне наиболее любопытными при проведении исследований. Многие темы связаны с недавними открытиями и заманчивыми перспективами, они активно изучаются в настоящее время и порой вызывают споры в среде ученых. Я попытался проверить актуальность всего, о чем пишу в своей книге, но в коротких статьях невозможно осветить все нюансы и тонкости. Мне ни в коем случае не хотелось бы ввести вас в заблуждение. Читайте мои статьи введением, а за дальнейшей информацией обращайтесь к источникам, указанным в конце книги.

Введение

Разнообразие птиц

Птицы — это потомки динозавров (с. 81). Более 160 млн. лет назад у отдельных видов динозавров появились перья. Эти рептилии и стали прародителями птиц. Удар метеорита 66 млн. лет назад уничтожил более 2/3 всех видов наземных животных, в том числе всех динозавров и почти всех птиц, за редким исключением. Согласно общепринятой теории, сегодня на Земле существует примерно 11 тыс. видов птиц, причем 800 из них регулярно встречаются в США и Канаде. Эти виды чрезвычайно разнообразны, и примеры их удивительной адаптации и способностей приведены в данной книге.



ЭВОЛЮЦИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР И ПОЛОВОЙ ОТБОР

Невероятное разнообразие птиц — результат миллионов лет эволюции. Эволюция отбирает наиболее жизнеспособных птиц точно так же, как селекционеры цветов отбирают растения с характеристиками, которые хотят усилить у будущих поколений. В дикой природе заболевания, погодные катаклизмы и хищники устраняют менее приспособленных особей из популяции. Одновременно представители разных полов выбирают партнеров с наиболее привлекательными характеристиками, предпочитая сильных и здоровых всем остальным. От естественного и полового отбора зависит, какая особь выживет и воспроизведет себя. Это, в свою очередь, влияет на характеристики следующего поколения. В течение сотен миллионов поколений этот процесс приводит к существующему разнообразию жизни на Земле. Естественный отбор происходит за счет выживания, классического «выживания наиболее приспособленных» согласно Дарвину. Отсюда такое много-

образие форм клювов, крыльев, вариантов гнездования и т.д. Птицы, наиболее приспособленные к жизни, сильнее и здоровее, их потомство многочисленнее, и они передают свои черты большему количеству потомков. Половой отбор диктуется выбором партнера, и особи разных полов ориентируются на конкретные черты. Так, к примеру, может развиваться пышное оперение, как у самцов каролинской утки (с. 177).

Оперение

ФУНКЦИЯ ПЕРЬЕВ

Если вас спросить: «Как выглядит перо?», то вы, скорее всего, представите нечто овальной формы, со стержнем посередине и с большим количеством бородок по обе стороны (как на рисунке ниже). Однако перья разных птиц сильно различаются по структуре и размерам. Аналогично, если спросить: «Для чего нужны перья?», вам сразу придет на ум полет и теплоизоляция. Конечно, это так, но у перьев есть еще ряд функций. Перья сохраняют тело птицы в тепле и сухости, придают им обтекаемую форму. Благодаря перьям птицы маскируются. Два главных свойства пера — легкость и невероятная прочность.



- 🦋 Перья появились не из чешуи. Предшественники перьев были жесткими и полыми, но постепенно обрели более сложную структуру (с. 33).
- 🦋 Сложная система перьев с многочисленными бородками обеспечивает многие из их удивительных свойств (с. 11).
- 🦋 Прочность пера обеспечивается тем, что волоски пролегают плотно от кончиков самых маленьких бородок к основанию стержня пера (с. 11).
- 🦋 Перья отличаются множеством форм. Даже у одной особи перья на разных частях тела различаются (с. 107).
- 🦋 У перьев сов есть свои особенности, позволяющие им летать совершенно бесшумно (с. 65).
- 🦋 Напоминающие щетину перья вокруг клюва, судя по всему, защищают глаза (с. 97).

Перья как защита от влаги

- 🦅 Перья отталкивают воду благодаря точно выверенному расстоянию между бородками. Вода не может ни просочиться между ними, ни впитаться в поверхность (с. 17).
- 🦅 У водных птиц бородки расположены теснее, что затрудняет проникновение воды. К тому же у них более жесткие перья, чем у сухопутных птиц (с. 17).
- 🦅 Перья плотно облегают нижнюю часть тела водоплавающей птицы, формируя водонепроницаемую оболочку (с. 11).
- 🦅 У птиц семейства баклановых имеются перья с водонепроницаемым центром, которые моknут по краям (с. 27).
- 🦅 Перья сов хуже отталкивают воду, чем перья других птиц. Вероятно, поэтому совы любят прятаться в укрытия (с. 180).

Перья как теплоизоляция

- 🦅 Утиный и гусиный пух до сих пор считается самой эффективной теплоизоляцией среди природных и синтетических материалов (с. 9).
- 🦅 Перья защищают птиц и от жары, и от холода (с. 107).

Перья и полет

- 🦅 Крупные перья в крыльях и хвосте образуют широкую ровную плоскость, позволяющую летать (с. 69).
- 🦅 Благодаря особенностям формы и строения перья крыльев обладают прочностью и гибкостью в нужном соотношении (с. 103).

Перья как украшение

Перья поражают разнообразием цветов и узоров. Кроме того, они создают объемные формы.

- 🦅 «Ушки» или «рожки» у некоторых сов — это пучки перьев для демонстрации сородичам и камуфляжа (с. 63).
- 🦅 Хохолок у сойки или кардинала — это обычные перья, птицы могут опускать и поднимать их по желанию (с. 147).
- 🦅 Своеобразные кончики перьев с жесткой и гладкой текстурой у свиристелей служат для украшения (с. 185).

СКОЛЬКО ПЕРЬЕВ У ПТИЦ?



Количество перьев отчасти зависит от размера птицы и от того, насколько она нуждается в защите от влаги.

- 🦅 У маленьких певчих птичек обычно около 2 тыс. перьев, причем летом меньше, а зимой больше. Крупные птицы, такие как вороны, обычно имеют перья большего размера, но не в большем количестве (с. 161).
- 🦅 У водных птиц больше перьев, чем у сухопутных, особенно на тех участках тела, которые часто контактируют с водой (с. 17).
- 🦅 Длинная шея лебедя покрыта густым оперением. На одной только его шее насчитывается более 20 тыс. перьев (с. 7).

УХОД ЗА ПЕРЬЯМИ

Перья имеют решающее значение для выживания птиц, и поэтому они проводят много времени, ухаживая за перьями. Чаще всего пернатые занимаются чисткой перьев с помощью клюва (для перьев на туловище) или когтей (для перьев на голове). Благодаря этой процедуре перья укладываются на свои места, избавляются от застрявших комочков грязи и покрываются защитным слоем сала, а кроме того, из них удаляются паразиты. Однако уход за перьями подразумевает и другие действия.

- 🦅 Ежедневно как минимум 10% своего времени птицы проводят, очищая перья. У всех видов этот процесс проходит по схожей схеме. Чистка настолько важна, что некоторые особенности строения клюва появились специально для этой процедуры (с. 145).

- 🐦 Птица не может почистить перья на голове клювом и поэтому вынуждена использовать лапы. Некоторые виды чистят перья на голове друг другу (с. 183).
- 🐦 Птицы регулярно купаются, скорее всего, потому, что вода способствует обновлению перьев (с. 137).
- 🐦 У некоторых видов птиц распространено купание в пыли, хотя его цель до конца не выяснена (с. 161).
- 🐦 Два действия птиц, ставящие в тупик наблюдателей, — долгое сидение на солнце и набирание в перья муравьев (так называемое муравление). Природа этих процессов пока плохо изучена. Скорее всего, сидение на солнце нужно для ухода за перьями, а муравьев птицы просто склевывают (с. 109).
- 🐦 Стервятники часто расправляют крылья на солнце, также по неизвестной причине (с. 59).
- 🐦 Пока не удалось полностью объяснить, зачем раскрывают крылья бакланы. Возможно, так они сушат перья после плавания (с. 27).

Рост новых перьев

Перья изнашиваются и периодически нуждаются в замене (в среднем раз в год). Этот процесс называется линькой. У большинства птиц развился упорядоченный режим постепенной линьки, не мешающей полету и защите от температур и влаги.

- 🐦 Перья вырастают из перьевых мешков в кожном покрове, свернутыми в цилиндр. Сначала высвобождается кончик (с. 15).
- 🐦 Из одного и того же мешка под влиянием гормонов в разное время могут вырасти перья совершенно разных цветов и с разными узорами. Многие птицы используют период линьки, чтобы сменить свой окрас. Они линяют дважды в год, один раз — после брачного периода, сменяя окрас на тусклый и незаметный, а второй раз — в весенне-летний брачный период, приобретая яркую расцветку (с. 165, 186).
- 🐦 Отросшее перо меняется только путем износа, выцветания и загрязнений (с. 47).



- 🐦 Каждое перо вырастает лишь на несколько миллиметров в день, так что даже мелким птицам нужно хотя бы шесть недель на линьку. У крупных

птиц этот процесс длится дольше. Едва заметные темные и светлые полоски отмечают каждый день и ночь роста пера (с. 175).

- 🐦 Нужно много энергии, чтобы вырастить новые перья, что затрудняет полет и сохранение тепла, поэтому обычно линька проходит в теплое время года и не накладывается на другие трудозатратные процессы вроде гнездования или миграции (с. 165).
- 🐦 У большинства видов обновление перьев в крыльях происходит постепенно, чтобы птица могла продолжать полеты (с. 99).
- 🐦 Гусиные и утиные при линьке теряют все маховые и рулевые перья сразу, теряя возможность летать на несколько недель в конце лета, что делает их более уязвимыми, но на более короткий срок (с. 5).
- 🐦 В редких случаях птица теряет все перья с головы сразу без очевидных негативных последствий (с. 147).

Окрас птиц

Внешний вид птиц поразителен и отличается большим разнообразием. Частично это потому, что птицы в основном полагаются на зрение, поэтому их внешний вид является важным сигналом для других птиц и серьезно влияет на естественный отбор. Цвет оперения может быть результатом двух противоположных явлений: либо это содержание пигмента, либо микроструктуры поверхности.

Пигменты

Пигменты — это молекулы, вступающие в электромагнитное взаимодействие с силой света и отражающие световые волны определенной длины, одновременно поглощая остальные. Структура молекулы и расположение электронов в ней определяют диапазон длины волн, которые будут отражаться. У птиц пигменты делятся на две основные группы: каротиноиды, отвечающие за красно-желтый спектр, и меланины, отвечающие за черно-серый и коричнево-бежевый спектр.

- 🐦 Компоненты каротиноидов птицы могут получить только с пищей, поэтому считается, что более яркий окрас, созданный каротиноидами, является признаком здоровья и хорошей физической формы, хотя подтверждения этого факта недостаточно убедительны (стр. 163).

- ✎ Недавно в Северную Америку было завезено растение с новой молекулой каротиноидов, которое подарил желтые тона оперению американских свиристелей и некоторых других видов (с. 139 в центре).
- ✎ Для получения яркого окраса одних пигментов недостаточно, нужны светоотражающие белые перья под слоем желтых или красных перьев, которые служат фоном (с. 165).
- ✎ Тот оттенок в оперении птиц, который мы называем зеленым, чаще всего является сочетанием желтых (каротиноиды) и серых (меланины) пигментов (с. 121).
- ✎ Яркий окрас птиц больше всего восхищает, когда мы видим его на фоне темных узоров, а насыщенность черного цвета, который придает меланин, зависит от качества пера (с. 186).
- ✎ Меланин не только является красящим пигментом, но еще и делает материал более прочным. Именно по этой причине птицы часто имеют темный окрас. Темные кончики крыльев встречаются у многих видов, поскольку эти места больше подвержены износу и повреждениям, а меланин укрепляет перья (с. 47). Другие примеры появления меланина — это темные точки и пятна на скорлупе яиц, делающие ее более прочной и снижающие необходимость в кальции (с. 109), и темная окраска клюва зимой, придающая дополнительную прочность ввиду более грубой зимней пищи (с. 137).
- ✎ Помимо всего прочего, меланин позволяет бороться с бактериями, заражающими перья, что особенно важно во влажном климате (с. 159).
- ✎ Иногда у птицы вырастают перья с низким содержанием или отсутствием меланина. Это может иметь разные причины и последствия:
 - содержание меланина может снижаться вплоть до полного отсутствия, приводя к появлению более бледных особей, чем обычно, с белыми пятнами или полностью белых (с. 173);
 - снижение уровня меланина позволяет проявиться другим пигментам и создавать необычный окрас и узор (с. 85).

Структурный окрас

Гораздо более разнообразная палитра получается за счет изменения в структуре без участия пигментов. Структурный окрас возникает в результате взаимодействия волн света с микроскопической структурой пера, приводящего к отражению световых волн определенной длины. Разноцветная пленка, которую дает слой

нефти на поверхности воды,— это пример основного принципа: сами по себе нефть и вода не имеют выраженного цвета, но взаимодействие волн света с тонким слоем нефти на воде порождает разноцветное пятно.

- ✎ Великолепные расцветки колибри, напоминающие блеск драгоценных камней, появляются за счет наноструктуры их перьев (с. 77).
- ✎ Перья на грудке самцов колибри особенно элегантны. Они отражают чистый цвет, причем только в одном направлении (с. 77).
- ✎ У птиц нет синего пигмента. Синие оттенки оперения восточной сialis и других видов достигаются за счет того, что синие световые волны отражаются во всех направлениях (с. 127).
- ✎ У североамериканских птиц нет зеленого пигмента. Яркий зеленый цвет создается структурой пера, как у колибри, или в результате сочетания синего и желтого цветов (с. 85).

Цветные узоры

На оперении птиц появились пестрые узоры, служащие разнообразным целям. Обычно яркие узоры — это сигналы особям противоположного пола. Сложные узоры обычно должны запутывать врагов и служить камуфляжем. Яркие контрастные узоры могут служить целям камуфляжа (искажать очертания птицы) или отпугивать хищников.

- ✎ Узоры отдельных перьев могут быть бесконечно сложными и развиваться по мере роста пера (с. 15).
- ✎ Такие сложные узоры в пределах одного пера создаются за счет пигмента меланина (черно-коричневая гамма), а каротиноидные цвета (желто-красный спектр) обычно окрашивают все перо (с. 186).
- ✎ Сложные узоры отдельных перьев — лишь одна деталь общего целого. Все оперение птицы очень хитроумно организовано и является потрясающим орнаментом из нежных оттенков и переходов цветов (с. 71).



- 🦅 Яркие цветочные пятна, например белая гузка, могут служить для того, чтобы поразить хищников (с. 93) или добычу (с. 135).
- 🦅 Окрас многих птиц напоминает очертания морды животного, предположительно, с целью отпугивания хищников (с. 61, 119).

Разнообразие птиц

Внешне особи одного возраста и пола внутри каждого вида обычно выглядят довольно похоже. Например, взрослые самцы любого вида очень похожи друг на друга, но при этом могут сильно отличаться от самок. Молодняк может визуально отличаться от взрослых, а одна и та же взрослая особь может по-разному выглядеть зимой и летом.

Различия между самками и самцами

- 🦅 У многих птиц самки и самцы похожи. В таких случаях пол птицы можно определить по ее поведению (с. 3).
- 🦅 У других видов самки и самцы сильно отличаются внешне, и этот половой диморфизм часто усиливается во время миграции (с. 186).
- 🦅 Самки и самцы популяции отличаются главным образом цветом макушки (с. 119).
- 🦅 У большинства видов самки и самцы примерно одинакового размера; самцы обычно немного крупнее. Однако у ястребов, сов и колибри самки существенно мельче самцов по невыясненной пока причине (с. 51).

Различия, вызванные возрастом и сменой времен года

У молодняка и взрослых особей часто отличается окраска, но размер птиц с возрастом не меняется.

Птицы достигают максимального размера примерно к моменту первого полета и сохраняют этот размер на всю жизнь. Размер зрелой взрослой особи примерно одинаков для всего вида, независимо от того, один месяц особи или десять лет, самка это или самец. Размер важен при идентификации птиц. Если вы видите в стайке синиц особь меньшего размера, то это не птенец, а особь другого вида.

- 🦅 Как правило, наиболее яркую окраску птицы принимают в брачный сезон. Вне брачного сезона они окрашены в более блеклые цвета. Особи, не

достигшие зрелости, круглый год окрашены не ярко (с. 21).

- 🦅 У совсем молодых красных кардиналов темные клювы и тусклое оперение. Окрас зрелой птицы они приобретают через несколько недель после покидания гнезда (с. 147).
- 🦅 Не достигших зрелости ворон можно отличить от взрослых птиц по цвету и качеству пера на крыльях и хвосте (с. 105).
- 🦅 Существуют виды, линяющие дважды в год, чтобы обновить перья, и при этом кардинально меняющие свою окраску в разные сезоны (с. 165).
- 🦅 Самцы и самки, молодняк и взрослые особи некоторых видов имеют разные миграционные повадки и зимуют в различных регионах (с. 155).

Региональные различия и подвиды

Популяции птиц постоянно меняются, адаптируясь к новым трудностям и возможностям. Непрерывно происходящая эволюция может привести к тому, что какой-либо локальный вид будет сильно отличаться от соседнего. Мы замечаем эту разницу, но сами птицы не придают ей значения. Такие популяции выделяются в подвиды.

- 🦅 Происходит эволюция новых видов, и у некоторых птиц мы можем наблюдать переходные этапы, например, у темноглазого юнко (с. 187).
- 🦅 Во многих случаях региональные различия следуют общим тенденциям, связанным с климатом (с. 159).
- 🦅 Золотые шилоклювые дятлы, обитающие на разных концах континента, отличаются окраской перьев хвоста и крыльев. На западе они красные, а на востоке — желтые (с. 93).
- 🦅 Клювы быстро меняют форму, когда птицы подстраиваются под новый рацион (с. 161).
- 🦅 У нескольких видов ястребов наблюдаются удивительно разные окраски, независимо от пола или возраста. Каждый вариант более эффективен для охоты в определенных условиях (с. 51).

Чувства птиц

Птицы в основном воспринимают мир посредством зрения и слуха, как и люди. По части зрения, слуха, осязания и обоняния многие виды птиц превосходят нас. Кроме того, птицы способны чувствовать магнитное поле Земли.

ЗРЕНИЕ

В целом у птиц отличное зрение, во многом лучше человеческого. Они различают более широкий спектр волн, включая ультрафиолетовый, лучше отслеживают быстро движущиеся предметы. Угол обзора у них достигает 360° за счет периферийного зрения и нескольких точек фокуса. Некоторые птицы хорошо видят под водой, другие способны различать очень мелкие предметы, третьи отличаются отличным ночным или цветным зрением. Но зрительное восприятие сильно варьируется от вида к виду. Многие птицы видят меньше деталей, чем мы, но компенсируют это более широким полем зрения и более точным отслеживанием движения.

Различение цвета

- Орлы замечают в 5 раз больше подробностей и примерно в 16 раз больше оттенков цвета (с. 57).
- Многие птицы видят волны ультрафиолетового спектра. У некоторых видов птиц есть узоры на перьях в ультрафиолетовом спектре (с. 184).



Ночное видение

- Совы активны ночью и обладают отличным слухом, но все же в основном полагаются на зрение для охоты и общения. Цветное зрение ночью бесполезно, поэтому в основном они видят все в черно-белых цветах (с. 63).
- Птицы с крупными глазами обычно лучше видят при слабом свете, что позволяет им быть активнее в утренних и вечерних сумерках (с. 131).

Угол обзора

Глаз человека фокусируется на одной небольшой точке или детали, но птицы видят несколько отдельных областей пространства. У большинства птиц не развито бинокулярное зрение (при котором изображения, полученные каждым глазом, сливаются в одно). Они почти не видят собственный клюв, однако могут широко обзирать окружающее пространство.

- Многие птицы одновременно имеют обзор на 360° горизонтально вокруг себя и на 180° вертикально, причем видят предметы как бы на горизонтальной полосе (с. 45).
- У орлов четыре фокусные точки, по две с каждой стороны (с. 57).
- Поскольку у птиц наиболее сильно боковое зрение, им приходится наклонять голову набок, чтобы рассмотреть предметы сверху или снизу одним глазом (с. 57, 127).
- Птицы, у которых глаза расположены спереди, чтобы видеть больше предметов перед собой, теряют способность видеть предметы позади и вынуждены чаще поворачивать голову, чтобы проветривать пространство за собой (с. 167).
- У сов глаза расположены спереди, из-за чего за спиной у них появляется большое «слепое пятно». Это одна из причин того, зачем им нужна способность поворачивать голову больше чем на 120° (с. 63).

Обработка изображения

- Птицы быстрее людей обрабатывают визуальную информацию, что очень важно во время охоты или для осмотра пространства при быстром полете (с. 55).
- Недавно открытый вид колбочек в глазах тиранновых, возможно, предназначен для отслеживания быстрых движений. Это одно из приспособлений, помогающих данному виду птиц замечать и ловить крошечных летающих насекомых в воздухе (с. 97).

Подводное зрение

- Некоторым птицам необходимо видеть и в воздухе, и в воде. Для этой цели у них развились подвижные хрусталики (с. 27).
- Некоторые птицы ловят рыбу по ночам или ныряют на такую глубину, куда почти не проникает свет. Как они находят рыбу? Этого никто не знает (с. 25).
- Цапли и белые цапли могут корректировать преломление света на поверхности воды, когда они нацеливаются на добычу (с. 33).

Другие зрительные особенности

- При ходьбе птицы качают головой, чтобы стабилизировать получаемое изображение (с. 75).
- У птиц есть удивительная способность держать голову строго в определенном положении при парении в воздухе, чтобы не сводить взгляда с добычи (с. 83).
- У птиц есть мигательная перепонка — дополнительное веко, защищающее глаз от повреждений (с. 149).

СЛУХ

Уши птиц — небольшие отверстия по бокам головы ниже и позади глаз, обычно прикрытые и окруженные особыми перьями, регулируемыми направлением звука. У разных видов слух развит по-своему, но в основном он превосходит человеческий в чувствительности и обработке, но не в диапазоне слышимых частот. Также у птиц есть механизмы снижения шума, производимого ими самими, чтобы лучше воспринимать звуки вокруг.

- Обыкновенные сипухи могут ловить мышей в полной темноте, руководствуясь только слухом. Особенности расположения и строения уха позволяют им точно определять положение источника звука (с. 65).
- Мозг птицы обрабатывает звук в два раза быстрее нашего, поэтому они слышат больше разнообразных звуков. Однако в целом люди воспринимают больший диапазон частот (с. 157).
- Громкость птичьих сигналов, издаваемых так близко к их собственным ушам, повредила бы их слух, если бы не ряд предотвращающих это механизмов (с. 109).
- Обтекаемое перьевое покрытие ушей почти у всех птиц предположительно помогает им слышать происходящее вокруг во время полета в ветреную погоду (с. 107).
- У сов развились особые мягкие перья, заглушающие звук собственного передвижения (с. 65).

ВКУС

- Птицы различают разные вкусы. По всей длине их клюва до самого кончика расположены вкусовые сосочки (с. 19).
- Вероятно, многие птицы, про которых обычно говорят, что они охотятся на ощупь, также используют вкусовые сосочки на кончике клюва (с. 35).

ОБОНЯНИЕ

Все птицы различают запахи в любом случае не хуже, чем люди. У некоторых видов обоняние развито чрезвычайно.

- Некоторые виды, такие как гриф-индейка (с. 59) и американский вальдшнеп (с. 179), при охоте ориентируются исключительно на нюх.
- Многие птицы различают запахи достаточно хорошо, чтобы отличать представителей своего вида от чужаков, самок от самцов, распознавать хищников, растения, зараженные насекомыми, и т. д. (с. 137).
- Голуби и другие виды птиц могут использовать обоняние для навигации (с. 73).

ОСЯЗАНИЕ

У многих видов на кончике клюва сосредоточено множество нервных окончаний, делающих его чувствительным. Розовая колпица (с. 179) и некоторые другие виды охотятся исключительно на ощупь.

- Кончик клюва бекаса достаточно чувствителен, чтобы распознать малейшую разницу в давлении при исследовании почвы и почувствовать предмет до момента прикосновения к нему (с. 43).
- Ибисы при охоте пользуются зрением и осязанием (с. 35).
- Нитевидные перья в основании каждого пера позволяют птицам чувствовать движение каждого пера в отдельности (с. 141).

ДРУГИЕ ЧУВСТВА

У птиц исключительно развито чувство равновесия из-за того, что у них лишь две ноги и они вынуждены постоянно балансировать.

- Отменное чувство равновесия у птиц обеспечивается органом равновесия в их среднем ухе (как у людей) и вторым органом равновесия в тазу (с. 149).
- Во сне птицы способны сохранять равновесие, сидя на крошечном сучке (с. 121).
- Птицам легко балансировать на одной ноге благодаря дополнительному органу равновесия и некоторым особенностям строения ног (с. 35).
- Птицы чувствительны к магнитному полю (с. 73). Вполне возможно, что они каким-то образом его «видят» (с. 141).

- Птицы чувствуют изменения атмосферного давления (с. 47).
- Птицы следят за движением солнца и отлично чувствуют время (с. 186).



МОЗГ ПТИЦЫ

За исключением сов, птиц принято считать не очень умными существами. Однако эксперименты и наблюдения показали, что у птиц сильно развитый интеллект. Забавно то, что как раз совы принадлежат к числу не слишком умных птиц.

- Голуби ни у кого не ассоциируются с высоким интеллектом, однако они способны к абстрактному мышлению (с. 73).
- У большинства попугаев ведущая нога — левая, а способность выполнять задания, в которых участвует лишь одна сторона тела, связана с более развитой способностью решать проблемы (с. 85).
- Вороны необычайно умны и любопытны, они даже понимают принцип справедливого обмена (с. 183).
- Птицы могут узнавать конкретных людей (с. 105, 135).
- Вороны способны решать головоломки. В некоторых случаях они демонстрируют уровень мышления, сопоставимый с мышлением пятилетнего ребенка (с. 107).
- Сойки способны понимать намерения других своих сородичей (с. 111).
- Некоторые птицы могут запоминать до 1000 тайников, причем помнят, что хранят в каждом из них (с. 113).
- Сообща птицы лучше решают проблемы, чем поодиночке (с. 187).

СОН

- Птицы могут спать с одним открытым глазом. Полушария их мозга отдыхают по очереди (с. 75).
- Некоторые птицы проводят всю зиму в полете и даже спят на лету (с. 183).

Движение

ПОЛЕТ

По большей части эволюция птиц руководилась требованиями к полету: их тела становились более легкими и обтекаемыми, а вес сконцентрирован в компактном центре тяжести. Перья необходимы для полета, как способ максимально снизить вес, — и это только базовые приемы адаптации к жизни в воздухе. Даже если бы у человека выросли огромные крылья, он не смог бы полететь, как птица, по причине тяжести и неуклюжести.

- Вместо тяжелых челюстей и зубов у птиц легкий клюв (с. 7).
- Мышечная масса птицы сосредоточена в центре тела, а конечности приводятся в движение легкими сухожилиями (с. 69).
- Крупные мышцы, необходимые для махов крыльями, расположены под крыльями для равновесия. Мышцы, поднимающие крылья, находятся в нижней части туловища (с. 69).
- Птицы испражняются «концентрированной» мочой, чтобы не нести лишний груз в виде воды (с. 173).
- Яйца позволяют самке птицы продолжать полеты, пока ее потомство растет в гнезде (с. 157).
- Сама форма яйца, очевидно, обусловлена ограничениями, вызванными потребностью летать (с. 169).
- Форма крыльев определяется относительной длиной костей и перьев. Она связана со стилем полета и у каждого вида развивалась в соответствии с его потребностями (с. 99).
- Виды, у которых размер крыльев больше относительно массы их тела, более активны в воздухе, и им проще летать. Видам с меньшей площадью крыла требуется более высокая скорость движения, чтобы оставаться в воздухе (с. 99).
- У большинства птиц лишь один режим полета — перемещение. Но ястребы используют разные режимы в зависимости от задач (с. 51).
- Только колибри могут зависать на одном месте (с. 79), зимородковым и другим «зависающим

в воздухе» птицам нужен хотя бы небольшой ветер, чтобы сохранять свое положение в воздухе (с. 83).

- 🦅 Некоторым птицам длинный раздвоенный хвост улучшает аэродинамику, а другие захватывают хвостом насекомых (с. 97).
- 🦅 Разумеется, взрослые птицы не боятся высоты (с. 145).
- 🦅 Большинству водоплавающих птиц для взлета необходим долгий разгон на воде (с. 21).
- 🦅 У некоторых видов утиных развилась способность взлетать непосредственно с воды, отталкиваясь крыльями от поверхности (с. 11).

Эргономичность

Полет очень энергозатратен. Он требует в 30 раз больше энергии, чем отдых. Поэтому у птиц развилось множество приспособлений и поведенческих механизмов, повышающих продуктивность.

- 🦅 Стаи птиц летают клином, чтобы пользоваться потоками воздуха от крыльев птицы, летящей впереди. В этом им помогает паразитерная чувствительность к движению воздуха и его подъему (с. 5).
- 🦅 Виды, которые складывают крылья в виде двугранного угла (направляя крылья вверх горизонтально), немного теряют в высоте, зато держатся в воздухе более стабильно (с. 59).
- 🦅 Парящие птицы могут использовать теплые потоки восходящего от земли воздуха, чтобы набрать высоту, не делая взмахов крыльями (с. 61).
- 🦅 Волнообразная траектория, которую выбирает большинство мелких птиц, по расчетам не является наиболее эффективным режимом, но поскольку она так активно используется, у нее должны быть свои преимущества (с. 163).

ПЛАВАНИЕ

Водоплавающие птицы сталкиваются с множеством особых трудностей. Им нужно оставаться сухими, что достигается за счет адаптации оперения.

- 🦅 Плавая на поверхности воды, все птицы гребут лапами. У большинства видов имеются перепонки, хотя есть водоплавающие птицы и с пальчатыми лапами (с. 19).
- 🦅 Многие виды погружаются в воду полностью и плавают под водой в поисках добычи (с. 21).

- 🦅 Плавая под водой, большинство птиц гребут лапами, но некоторые виды используют крылья (с. 25).
- 🦅 Ныряющие птицы могут уменьшить свою плавучесть, сжав перья, чтобы те удерживали меньше воздуха, а также выдохнув воздух из воздушных мешков (с. 23).
- 🦅 Кайры могут нырять на глубину до 200 метров, однако до сих пор неизвестно, как они там выживают и как находят рыбу (с. 25).

ХОДЬБА

- 🦅 Одни виды птиц ходят вразвалку, другие вприпрыжку. Причина этого различия пока не установлена (с. 153).
- 🦅 Наклон головы, свойственный голубям и многим другим видам, нужен для лучшего зрения (с. 75).
- 🦅 Дятлы цепляются за кору лапами, а жесткий хвост используют как подпорку (с. 91).
- 🦅 Поползни часто забираются на деревья головой вниз или боком (с. 119).



РЕКОРДСМЕНЫ

- 🦅 Самое быстрое животное в мире — сокол сапсан, у которого зарегистрирована скорость 389 км/ч (с. 61).
- 🦅 Вероятно, самый быстрый бегун среди североамериканских птиц — дикая индейка, развивающая скорость до 40 км/ч. А быстрее всех птиц в мире бегают страус (с. 81).
- 🦅 Быстрее всего крыльями машут колибри. Самые маленькие среди них делают более 70 махов крыльями в секунду (с. 181).
- 🦅 Возможно, самыми разносторонними птицами являются чайки: они хорошо летают, бегают и плавают (с. 179).



Канадская казарка

Канадская казарка с выводком

50 лет назад этот вид был излюбленным символом дикой природы и смены времен года. После значительного роста численности популяции многие стали считать эту птицу городским паразитом




Птенец канадской казарки нескольких дней от роду

■ Подобно уткам, бекасам и курам, казарки — выводковые птицы: их птенцы вылупляются с открытыми глазами, в полном оперении, способные ходить, плавать, прокормить себя и поддерживать температуру своего тела уже через несколько часов после рождения. По большей части их поведение инстинктивное, и птенцы, вылупившиеся в инкубаторе в отсутствие родителей, вполне могут позаботиться о себе и вырасти во взрослых казарок. В дикой природе казарка защищает молодняк от хищников и других опасностей, а также показывает им территории, богатые кормом, хотя сама и не кормит их. Наоборот, певчие птицы являются птенцовыми: они вылупляются голыми и беспомощными, с закрытыми глазами, и им требуется минимум две недели постоянного ухода и кормления, чтобы они могли выжить (с.103).

■ Птенцы инстинктивно привязываются к первому вероятному родителю, которого они видят (возникает импринтинг). У гусей критичный для импринтинга период составляет примерно 13–16 часов после вылупления. Только что вылупившиеся гусята не очень избирательны, они могут привязаться к представителю другого вида, например, к человеку или даже неодушевленному предмету. Подобное инстинктивное поведение важно для видов вроде гусиных, у которых выводок покидает гнездо вскоре после вылупления и для получения больших шансов на выживание птенцам необходима сильная привязанность к родителям.



Семейство канадской казарки



■ Самцы и самки казарки похожи друг на друга, что типично для представителей видов, у которых родители обоего пола совместно занимаются выращиванием потомства. Но отличить самца от самки все же можно, если внимательно наблюдать за их поведением. В семействе казарок самец обычно самый крупный, он тянется выше и выступает в роли охранника и защитника. В отличие от большинства других видов, гусиные обычно остаются со своей семьей на протяжении осени и зимы. У гусеобразных самца также называют гусаком, а самку — гусыней.

Пара канадских казарок:
слева самец, справа самка

Белый гусь

Гуси часто меняют направление и время перелетов, подстраиваясь под погодные условия и кормовую базу


Стая перелетных белых гусей



■ Построение клином при полете позволяет птицам экономить энергию и увеличивать дальность полета. Кроме того, полет клином упрощает общение, потому что птицы могут поддерживать зрительный контакт со всеми членами стаи. Построившись клином, птицы экономят силы благодаря восходящим потокам воздуха, образованным вожаком. Каждая птица оставляет за собой «след» в виде мини-вихря. Огибая изогнутую дугу крыла, воздух создает более высокое давление под ним и более низкое — над ним. Птица держится в воздухе за счет этой разницы. Большая часть крыла давит на воздух сверху — нисходящий поток, но высокое давление под крылом проталкивает воздух у кончика крыла, создавая восходящий поток. Птицы, летящие следом, уклоняются от нисходящего потока и меняют положение так, чтобы одним крылом поймать восходящий поток, оставленный летящей впереди птицей. Они даже подстраивают ритм движений крыльями и дистанцию от вожака, чтобы их махи совпадали и чтобы кончик крыла следовал той же траектории в воздухе и остался на восходящем потоке, созданном птицей, находящейся впереди. Для этого им нужна очень высокая чувствительность к движениям воздуха, его потокам и тяге, помогающая выбрать наиболее эргономичную траекторию.



Гуси, летящие клином



Линька белого гуся

■ Перья изнашиваются, и всем птицам нужно периодически заменять их в ходе линьки. В отличие от большинства птиц, меняющих крупные перья на крыльях постепенно и не теряющих способности летать (с. 99), утки и гуси теряют все перья сразу и отрастают новое оперение. Так они лишаются способности летать примерно на 40 дней в конце лета. Чтобы обезопаситься на время линьки, они выбирают уединенные водоемы, где мало хищников, а некоторые пролетают тысячи километров, зачастую в северном направлении, только чтобы перелинять. Популярными местами для линьки являются побережья, где часто можно найти сброшенные перья. Отрастив новые перья на крыльях, гуси начинают осенний перелет на юг.

■ У птиц нет зубов. Они могут немного измельчить пищу клювом, но по большей части за перемалывание пищи отвечает мускульный желудок. Еда хранится в зобе (расширяющейся полости в передней части тела), а затем через преджелудок попадает в мускульный желудок. Мускульный желудок удивительно мощен — к примеру, дикая индейка способна раскалывать в мускульном желудке орехи, а пестроносый турпан — раковины небольших моллюсков. Белые гуси питаются в основном растительной пищей, но иногда они проглатывают мелкие камушки, чтобы создать в мускульном желудке своего рода терку, помогающую измельчить пищу.



Лебеди

Этот лебедь —
аборигенный
вид в Европе

Лебедь-шипун чистит перья






Лебедь-шипун демонстрирует агрессию

■ Целью многих агрессивных поз является визуальное увеличение размеров птицы. Угрожающая поза лебедя-шипуна — идеальный пример. Лебедь приподнимает крылья над спиной, распушает короткое оперение шеи и бросается вперед по воде. Все это сопровождается устрашающим шипением. В большинстве случаев птицы блефуют, угрожая таким образом человеку, но лебедь-шипун весит около 10 кг, и он может наносить довольно сильные удары костистым ребром крыла или клювом, поэтому лучше с ним не связываться.

■ Длинные тонкие шеи лебедей и гусей нуждаются в утеплении в любую погоду, особенно при холодном ветре и постоянном контакте с водой. Чтобы меньше подставлять шею холоду и сохранять тепло, птицы с длинными шеями могут плотно укладывать шею на туловище. Противоточное кровоснабжение, как в птичьих лапах (с. 15), для шеи не годится, потому что мозгу нужен постоянный приток теплой, богатой кислородом крови. По этой причине у длинношеих птиц появилось плотное оперение по всей длине шеи, состоящее из мелких пуховых перьев. Надо заметить, что американский лебедь — рекордсмен по количеству перьев, обнаруженных на отдельно взятой птице. В сумме их насчитывается более 25 тыс., причем около 80% из них находятся на голове и шее.



Лебедь-шипун изгибает шею, чтобы сохранить тепло



■ Что такое клюв? Птичий клюв — легкая конструкция, держащаяся на каркасе из костей двух типов. Сердечник из пористых костей заключен в тонкую оболочку более прочной кости, что делает клюв крепким и легким. Кости покрыты тонким слоем кератина (как наши ногти). Поскольку это живая ткань, клюв может постепенно менять цвет. Слой кератина постоянно отрастает вновь, чтобы восстановить поврежденные места и сохранить форму клюва, в том числе острые края и загнутый кончик, изнашивающиеся при использовании.

Строение клюва лебедя-шипуна. Серым цветом изображены кости, а тонкий слой кератина — оранжевым и черным

Домашние утки и гуси

Это лишь два примера
из огромного количества
различных видов
и гибридов этих
домашних птиц



Домашние разновидности мускусной утки (вверху)
и кряквы (внизу)



■ Более тысячи лет, с VII по XIX в., перья были основным инструментом для письма. Трубочатая структура стержня пера и сочетание в нем прочности и гибкости делали его идеальным пишущим инструментом. Просто срезав стержень по диагонали, можно было получить заостренный кончик. В полый стержень набиралась чернила. Обрезав бородки по краям стержня, можно было освободить место для захвата пальцами. Большие маховые перья таких птиц, как гуси и вороны, имели подходящий размер и всегда были в изобилии, особенно там, где гусей выращивали на мясо. В начале XIX в. Россия ежегодно экспортировала 27 млн. гусиных перьев. Современное английское слово *pen* («ручка») восходит к латинскому слову *penna* («перо»). Перочинные ножи были необходимейшими аксессуарами. С их помощью подготавливали перья для письма и чинили их.



Большие маховые перья серого гуся, обрезанные для письма



Покровное перо



Пуховое перо

■ Кроме того, что люди писали маховыми перьями птиц, они также нашли применение еще двум видам гусиных перьев. Покровные перья применяются для набивания подушек, а пушистые пуховые перья, растущие близко к телу птицы,— это самое эффективное средство теплоизоляции из всех существующих. Пух используют для производства пуховиков и спальных мешков. Никакой другой материал, хоть натуральный, хоть синтетический, не обладает аналогичным сочетанием высокоэффективных теплоизолирующих свойств и малого веса. Один из недостатков пуха заключается в том, что он теряет свои изоляционные свойства при намокании. Птицы справляются с этой проблемой, тратя много сил и времени на уход за перьями и сохранение их в сухости.

■ В прошлые века гуси были одними из самых ценных домашних птиц. В Европе серый гусь выращивался на мясо и ради яиц, а также служил источником перьев для пуха и ручек. Гуси также могли помочь в охране: благодаря своей бдительности и громким крикам они выступали в роли «сторожевых собак».



Домашний серый гусь

Содержание



Предисловие	•	vii
Как пользоваться этой книгой	•	viii
Введение	•	ix
Характеристика птиц	•	2
Птицы в этой книге	•	177
Что делать, если...	•	189
С чего начать наблюдение за птицами	•	191
Благодарности	•	192
Список литературы	•	193